

Querido aluno, preparei o texto abaixo como referência para auxiliá-los nos recursos ao gabarito preliminar.

Um beijo carinhoso em todos,

Professora Suzana Costa

RECURSO QUESTÃO 21 – PROVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM- SES/PE- AOC

Conforme Potter e Perry (2009), no seu capítulo 44 que aborda as necessidades de nutrição, habilidade 44-2 (página 1113) a determinação do comprimento da sonda a ser inserida segue o método tradicional, conforme citação abaixo:

“Método tradicional: Meça a distância da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e deste ao processo xifoide do esterno. “Continua afirmando que: “O comprimento se aproxima da distância do nariz ao estômago em 98% dos pacientes. Para a introdução duodenal ou jejunal, é necessário um adicional de 20 a 30 cm de comprimento. “

De acordo com Costa (2014), a medição seguindo a referência “(...) lobo inferior da orelha à base do nariz e daí ao apêndice xifoide” é executada para a inserção de sonda nasogástrica.

Sendo assim, na questão “21- Ao auxiliar o enfermeiro em uma passagem de sonda nasoenteral, o técnico em enfermagem observa que a marcação da sonda com adesivo indicará até onde ela deve ser introduzida. Para que a introdução da sonda ocorra corretamente, é necessário, primeiramente,” o gabarito dado como alternativa correta “(C) medir a extremidade que contém os orifícios da sonda desde a ponta do nariz até o lóbulo da orelha e deste até a borda inferior do apêndice xifoide.” É referente à medição da sondagem nasogástrica e **não nasoenteral**, como é solicitado no enunciado da questão.

RECURSO QUESTÃO 22 – PROVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM- SES/PE- AOC

Conforme Potter e Perry (2009), no seu capítulo 45 que aborda as necessidades de eliminação urinária, quadro 45-7 (página 1153) as indicações da sondagem vesical de alívio são:

- Alívio do desconforto de distensão da bexiga, medida de descompressão;
- Obtenção de amostra estéril de urina quando amostras de urina limpa são de difícil obtenção;
- Avaliação da urina residual após micção;
- Tratamento a longo prazo de clientes com lesões de medula espinal, degeneração neuromuscular, ou bexiga incompetentes.

Ainda conforme o mesmo autor, uma das finalidades da sondagem vesical de permanente (de demora), é: “(...) medição do débito urinário em cliente (...)”.

Logo, a questão “22. Foi indicada a um paciente de 45 anos do sexo masculino a sondagem vesical de alívio. Esse procedimento pode ter sido indicado pelos seguintes motivos, EXCETO” apresenta duas possibilidades de resposta: “(A) controlar o débito urinário.” E “(B) estimular o peristaltismo.”, uma vez que o controle do débito urinário é **uma finalidade da sondagem vesical de demora e não de alívio**.